

بررسی میزان شیوع پدیکولوز سر در دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی دخترانه شهرستان

مشهد- در سال تحصیلی 82-81

دکتر غلامحسن خدایی - دکتر نداچوبدار- فاطمه خدراتی- شراره کریمی-
مهندس سعید ابراهیم زاده

چکیده مطلب:

شپش سر یک بیماری انگلی پوستی انسان است و به علت نوع انتقال بیماری که عموماً در اثر تماس مستقیم با فرد آلوده و یا تماس غیر مستقیم با اشیاء آلوده صورت می گیرد و در محیطهای با تراکم جمعیتی شیوع بیشتری دارد ، اجتماع دانش آموزان در مدارس نیز از این مقوله می باشد. پیشگیری از شپش سر باعث ارتقاء سلامت جسمی و روانی جامعه و کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی می گردد. این مطالعه به روش مقطعی (Cross-Sectional) و با هدف تعیین میزان شیوع بیماری در مدارس ابتدایی و راهنمایی دخترانه و مقایسه آن با آمارهای ارائه شده به مرکز بهداشت استان انجام شد. پس از معاینه 3186 دانش آموز از مناطق مختلف شهری و روستایی، اطلاعات حاصله در پرسشنامه ثبت گردیده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها :

شیوع پدیکولوز در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی 104 نفر به ازاء هر 1000 نفر و در مقطع راهنمایی 81 نفر به ازاء هر 1000 نفر و در مجموع شیوع 94 به ازاء هر 1000 نفر برآورد گردید. همچنین بیشترین شیوع به تفکیک مقاطع تحصیلی در پایه سوم ابتدایی 138 به ازاء هر 1000 نفر و در پایه اول راهنمایی 93 به ازاء هر 1000 نفر و نیز بیشترین شیوع در منطقه رضوی 293 به ازاء هر 1000 نفر و کمترین شیوع در منطقه کلات و ناحیه 3 آموزش و پرورش بود که موردی مشاهده نشد.

نتیجه گیری :

یافته های فوق نشان می دهد که شیوع بالای پدیکولوز به عنوان یک معضل بهداشتی اجتماعی می باشد و نبود سیستم مناسب گزارش دهی در مراکز بهداشتی درمانی و آموزش و پرورش

باعث شده است که آمارهای ارائه شده به مرکز بهداشت استان
چنین شیوع بالایی را نشان ندهد. لذا توجه بیش از پیش به
این امر و عوامل مختلف موثر بر آن از ضروریات می باشد.

کلمات کلیدی:

پدیکولوزسر - مدارس ابتدایی و راهنمایی دخترانه - شیوع -
مشهد