

بررسی فراوانی زایمان پره ترم در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم

پزشکی مشهد سال ۱۳۹۱

نویسندگان: دکتر محمد احمدیان - پزشک عمومی . MPH. مشهد انتهایی خیابان سناباد مرکز بهداشت استان خراسان رضوی *نویسنده مسئول

مینا احدی - شماره موبایل ۰۹۱۵۳۰۰۴۸۵۸ - کارشناس ارشد مامایی - مشهد انتهایی خیابان سناباد مرکز بهداشت استان خراسان رضوی

ahadim1@mums.ac.ir

زهرا آقاسی یزدی - تلفن ۰۵۱۱۸۴۱۵۰۰۱ - کارشناس بهداشت خانواده - مشهد انتهایی خیابان سناباد مرکز بهداشت استان خراسان

اعظم بهزاد مهر - تلفن ۰۵۱۱۸۴۱۵۰۰۱ - کارشناس مامایی - مشهد انتهایی خیابان سناباد مرکز بهداشت استان خراسان

مقدمه: زایمان پره ترم که به صورت زایمان قبل از هفته ۳۷ حاملگی تعریف میشود تقریباً در دو سوم مرگهائی نوزادان در سال اول زندگی دخالت دارد و همچنان به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی عمده مطرح می باشد. شیوع زایمان پره ترم در مطالعات مختلف متفاوت ذکر شده ، لذا این بررسی به تعیین فراوانی این نوع از زایمان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی انجام شده است .

هدف: بررسی فراوانی زایمان پره ترم در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۱

روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی و گذشته نگر بر روی مادران ایرانی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ انجام شده و اطلاعات از ۴۰۲۹۳ پرونده بهداشتی مادر زایمان کرده استخراج و تجزیه تحلیل گردید .

نتایج: با توجه به یافته های این بررسی تعداد مادرانی که زیر ۳۷ هفته زایمان کرده بودند ۱۵۵۵ نفر می باشد که در مجموع درصد مادران مراجعه کننده ای که زیر ۳۷ هفته زایمان کرده بودند ۳٫۹ درصد می باشد. این شاخص در سه ماهه اول سال ۴ درصد و در سه ماهه دوم سال معادل ۳٫۹ درصد می باشد . طبق این بررسی درصد زایمانهای دوقلو در شش ماهه اول سال ۱٫۲ درصد و نوزادان با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم معادل ۵٫۶ درصد می باشد.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه تولد نوزاد نارس با مرگ میر و موربیدیت بالا در نوزادان همراه می باشد شناخت دلایل و انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش تولد این نوزادان ضروری به نظر می رسد .

کلمات کلیدی: مادر- نوزاد - زایمان -زایمان پره ترم