


بیش فعالی مثانه یا OverActive Bladder



منابع:

WF. Stewart, JB. Van Rooyen, .
GW. Cundiff, et al. Prevalence and
burden of overactive bladder in
the United States. World J Urol.
2003;20:327-336

-M. Kirby; W. Artibani; L. Car
dozo; C. Chapple; D. C. Diaz; D.
De Ridder; M. Espuña-Pons; F.
Haab; C. Kelleher; I. Milsom; P.
Van Kerrebroeck; M. Vierhout.
Overactive Bladder: the Impor-
tance of New Guidance CME. Re-
lease Date: November 15, 2006;
Valid for credit through Novem-
ber 15, 2007
[http://www.medscape.com/viewp
rogram/6242_pnt](http://www.medscape.com/viewprogram/6242_pnt)

نتایج درمان چگونه است؟

شناسایی و درمان بیش فعالی مثانه در
اوائل بیماری در مراقبت بیماران نفس
بهرتر و در کاهش هزینه ها نیز موثرتر
خواهد بود. اما در عمل تاخیر زیاد در
شناسایی و نیز در تداوم پی گیری درمانی
وجود دارد. شناساندن بیماری به افراد
جامعه از پدیده "شرم از اعتراف به
بیماری" و تسلیم شدن در مقابل این طرز
فکر که بی اختیاری بخشی از بالا رفتن
سن است خواهد کاست و به بالا بردن
اعتماد به نفس و کیفیت زندگی مبتلایان
کمک خواهد کرد.



انجمن اورولوژی ایران



دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
معاونت سلامت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی