

اصلاحیه بوکلت چارت های مانا:

بوکلت پزشکی:

صفحه ۵: در جدول انفوزیون مایعات وریدی و دو سطر زیر جدول حجم رینگر لاکتات: 20 ml/kg

صفحه ۶: در چارت شماره ۶ در جمله اگر کودک تب بالا دارد به ص ۲۵ مراجعه کنید

صفحه ۹: در ردیف آخر جدول (اسهال خونی) و ستون تشخیص نوع درمان، یک بولت به ابتدای اقدامات اضافه شود، برای مدت ۵ روز آنتی بیوتیک مناسب بدهید (ص ۲۶)

صفحه ۳۷: در ردیف اول جدول در ستون درمان بولت آخر، اگر انتقال امکان پذیر نیست به صفحه ۴۶ مراجعه کنید.

آموکسی سیلین در ستون تشخیص نوع درمان، صفحه ۳۷: در اولین ردیف زرد جدول (عفونت موضعی باکتریال) کیلوگرم برای ۵ روز / (۵۰ میلی گرم

موضعی خفیف " تغییر یابد ردیف زرد جدول، طبقه بندی به " عفونت باکتریال در دومین: 37 صفحه

صفحه ۴۶: جدول تزریق آنتی بیوتیک در ستون تجویز آمپی سیلین: یک ویال ۲۵۰ میلی گرم در ۱,۳ میلی لیتر آب مقطر حل شود

بوکلت غیر پزشکی:

صفحه ۸: بولت آخر (برای مدت ۵ روز آنتی بیوتیک مناسب بدهید حذف شود)

صفحه ۲۲: ردیف اول زرد رنگ طبقه بندی به " عفونت باکتریال موضعی خفیف " تغییر یابد.