

## شناسنامه و استاندارد خدمت

نمونه گیری از پاشنه پا بر کاغذ کتری

برای غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان، PKU، و G6PD

## **تنظیم و تدوین:**

دکتر سید علیرضا مرندی رییس انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران  
دکتر فرح اشرف زاده دبیر هیات ممکنه رشته تخصصی کودکان  
دکتر یدالله زاهد پاشا دبیر هیات ممکنه طب نوزادان و پیرامون تولد  
دکتر منصور بهرامی رییس انجمن پزشکان کودکان ایران  
دکتر شهین یار احمدی رییس اداره غدد و متابولیک مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت  
دکتر سید ابوالفضل افجه فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر محمد حیدرزاده فوق تخصص نوزادان و رییس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت  
دکتر پریسا محقق فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران  
دکتر نسترن خسروی فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران  
دکتر زیبا مسیبی فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران  
دکتر عباس حبیب الهی فوق تخصص نوزادان و کارشناس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت  
خانم مونا فاضلی کارشناس اداره غدد و متابولیک مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت  
خانم دکتر ساناز بخشنده رییس اداره استاندارد و راهنماهای بالینی معاونت درمان  
خانم آزاده حقیقی کارشناس اداره استاندارد و راهنماهای بالینی معاونت درمان  
خانم مرجان مستشار نظامی اداره استاندارد و راهنماهای بالینی معاونت درمان

## **تحت نظارت فنی:**

**دکتر سید موسی طباطبایی لطفی**

**دکتر ساناز بخشنده**

**گروه تدوین استاندارد و راهنماهای سلامت**

**دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت**

## مقدمه:

واژه **غربالگری نوزادان** به آزمون‌هایی اطلاق می‌شود که در چند روز اول زندگی نوزاد انجام می‌شود و نوزادانی را که ممکن است بیمار باشند (موارد مشکوک) از نوزادانی که احتمالاً بیمار نیستند جدا می‌کند. پس از غربالگری و تعیین موارد مشکوک باید **آزمایش‌های تایید تشخیص** انجام شده تا ابتلا به بیماری مسجل گردد.

غربالگری نوزادان فعالیتی پیشگیرانه است که منجر به تشخیص بیماری‌های قابل درمان اندوکراین، متابولیک، ژنتیک، عفونی و هماتولوژیک می‌شود. با شروع غربالگری نوزادان برای بیماری‌های متابولیک از دهه ۶۰ میلادی، افق جدیدی در ارتقاء سلامت نوزادان و کودکان باز شد و این فعالیت به عنوان یک فعالیت سلامتی بسیار مهم در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا و ایران درآمد. امروزه در کلیه مناطق اروپایی و آمریکایی و بسیاری از کشورهای توسعه یافته، برنامه غربالگری نوزادان انجام می‌شود، اما، هنوز، نوزادان ۲/۳ جهان از این نعمت بی بهره اند.

انجام غربالگری نوزادان نه تنها مزایای غیر قابل انکاری برای بیماران و خانواده هایشان دارد بلکه از هدر رفتن منابع عظیم انسانی و مالی پیشگیری می‌کند و با حفظ سلامتی مبتلایان، به توسعه کشورها کمک شایانی می‌نماید. لازم به ذکر است که فقط بیماری‌هایی قابلیت غربالگری و بیماریابی در سطح کشوری را دارند که معیارهای زیر را دارا باشند:

- ۱) مهم و جدی بودن بیماری مورد غربالگری
- ۲) عدم وجود علایم اولیه اختصاصی در مراحل اولیه بیماری
- ۳) شناخته شده بودن سیر طبیعی بیماری
- ۴) وجود آزمون غربالگری دقیق، آسان و مورد قبول
- ۵) وجود امکانات و معیارهای تشخیصی مورد نیاز
- ۶) وجود امکانات درمانی مورد نیاز
- ۷) هزینه به سود و هزینه اثربخشی مناسب انجام غربالگری

**بیماری کم‌کاری تیروئید نوزادان** به وضعیتی گفته می‌شود که به هر علتی غلظت هورمون‌های تیروئید در جریان خون نوزاد کم باشد. این بیماری یکی از شایع‌ترین علل قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی محسوب می‌شود. برنامه کشوری غربالگری بیماری کم‌کاری تیروئید در سال ۱۳۸۴ در سیستم سلامت کشور ادغام شده و یکی از موفق‌ترین برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و در مدت زمان کوتاهی به پوشش ۹۸٪ در کل کشور رسیده است. مطالعات نشان می‌دهد که در ۱۰۰ درصد بیماران درمان شده، ضریب هوشی در محدوده طبیعی بوده است که بیانگر موفقیت چشمگیر اجرای برنامه است.

## صرفه اقتصادی اجرای برنامه در کشور

اجرای این برنامه علاوه بر حفظ سلامتی کودکان، از دیدگاه اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه است. نسبت هزینه به فایده اجرای این برنامه، ۱ به ۲۲ به دست آمده است. به بیان دیگر از هر ۱۰۰۰ تومان که در اجرای این برنامه هزینه می‌شود، ۲۲۰۰۰ تومان صرفه اقتصادی نصیب مملکت می‌شود و در نتیجه اجرای این برنامه در کشور بسیار سودمند است.

## الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و لاتین) به همراه کد ملی:

نمونه گیری از پاشنه پا بر کاغذ گاتری برای غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان، PKU، و G6PD

Heel prick sampling on Guthrie paper for screening for Neonatal Hypothyroidism, PKU, and G6PD.

## ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی :

نمونه گیری از پاشنه پای نوزادان با استفاده از لانتست ایمن بر کاغذ گاتری S&S 903 برای اندازه گیری هورمون و آنزیم های TSH, G6PD, و PKU با استفاده از کیت های مخصوص اندازه گیری آنها

## ج) اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری:

۱) انجام غربالگری (نمونه گیری کاپیلری از پاشنه پا بر کاغذ گاتری با استفاده از لانتست ایمن)

۲) انجام آزمون غربالگری (آزمایش های TSH, PKU و G6PD با استفاده از کیت های مخصوص اندازه گیری آنها با

استفاده از نمونه لکه خون کاپیلری پانچ شده از کاغذ گاتری با استفاده از کیت NeoTSH)

۳) انجام آزمایش های تایید تشخیص سرمی با استفاده از خون وریدی

۴) ویزیت توسط پزشک

۵) شروع درمان در بیماران شناسایی شده

۶) ویزیت های مستمر و پیگیری های لازم

## • ارزیابی قبل از انجام پروسیجر

✓ آماده سازی نوزاد

✓ بررسی پاشنه پای نوزاد (نکته: در صورت زخم بودن پای نوزاد و یا در گچ بودن آن و یا هر مشکلی دیگر که نتوان از

پای نوزاد نمونه گیری کرد، می بایست از نرمه خارجی دست (در امتداد انگشت کوچک) نمونه گیری نمود.

✓ آماده کردن تجهیزات مورد نیاز نمونه گیری از پاشنه پا

✓ تکمیل فرم شماره ۱ (اطلاعات نوزاد)

## • ارزیابی حین انجام پروسیجر

✓ نمونه گیری استاندارد و مناسب بر اساس دستورالعمل برنامه بر کاغذ گاتری

✓ زدن چسب به محل نمونه گیری

• **ارزیابی بعد از انجام پروسیجر**

- ✓ خشک کردن نمونه بر اساس دستورالعمل
- ✓ قراردادن نمونه و فرم شماره ۱ در پاکت مخصوص
- ✓ تحویل آن به مامور جمع آوری برای ارایه به پست و رساندن نمونه در اسرع وقت به آزمایشگاه غربالگری نوزادان
- ✓ دادن آموزش ها و توصیه های لازم به والدین

• **کنترل عوارض جانبی انجام پروسیجر**

عارضه ای ندارد.


**د ( تواتر ارائه خدمت (تعداد دفعات مورد نیاز / فواصل انجام):**

تعداد غربالگری	شرایط نوزاد	
۱ بار در سن ۳-۵ روزگی	همه نوزادان	نوزادان ترم
۱ بار در هفته ۲ تولد	<p><b>نوزادان واجد شرایط نمونه گیری مجدد در هفته ۲ تولد</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• با وزن زمان تولد کم تر از ۲۵۰۰ گرم</li><li>• نوزادان با وزن زمان تولد بیش از ۴۰۰۰ گرم</li><li>• چندقلوها</li><li>• نوزادان بستری و نوزادان با سابقه بستری در بیمارستان در سن استاندارد غربالگری (۳-۵ روزگی)</li><li>• نوزادان با سابقه دریافت و یا تعویض خون</li><li>• نوزادانی که داروهای خاص مصرف کرده‌اند: مثل دوپامین و ترکیبات کورتونی</li><li>• نوزادانی که نتیجه آزمون غربالگری (نتایج آزمون اولیه TSH بر کاغذ فیلتر) آنان بین ۹/۹-۵ بوده است.</li><li>• نوزادانی که نمونه غربالگری آنان (کاغذ فیلتر حاوی لکه خون از پاشنه پا)، توسط آزمایشگاه غربالگری نوزادان، «نمونه نامناسب» ارزیابی شده است.</li></ul>	
<div>✓ در روزهای ۳-۵ تولد</div> <div>✓ در هفته ۲ تولد</div> <div>✓ در هفته ۶ تولد</div> <div>✓ در هفته ۱۰ تولد</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• همه نوزادانی که در سن ۳۷ هفته و یا کم تر جنینی متولد شده اند.</li></ul>	نوزادان نارس
اگر نوزاد نارس در هر کدام از نوبت های غربالگری از پاشنه پا، <b>بیمار</b> شناخته شده و درمان شروع شود، بقیه نوبت های غربالگری <b>منتفی</b> می شود.		

### ه) افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز (Order) / خدمت مربوطه و استاندارد تجویز:

این برنامه کشوری است و کلیه نوزادان شامل آن می شوند و نیاز به تجویز برای ارایه خدمت ندارد و آزمون غربالگری باید برای همه نوزادانی که در کشور، به طور زنده متولد شده، انجام شود.  
نوزادان مورد غربالگری، یا به مراکز نمونه گیری آورده شده اند و یا در بیمارستان بستری هستند.

مراکز نمونه گیری از پاشنه پای نوزادان در کشور



### و) افراد صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:

- ۱) نمونه گیران آموزش دیده در مراکز نمونه گیری از پاشنه پا
- ۲) پرسنل دوره دیده بخش های نوزادان و NICU

**ز) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:**

ردیف	عنوان تخصص	تعداد مورد نیاز به طور استاندارد به ازای ارائه هر خدمت	میزان تحصیلات مورد نیاز	سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم	نقش در فرایند ارائه خدمت
۱	نمونه گیر (بهورز، مراقب سلامت، ماما، کارشناس بهداشت، بهیار، پرستار و کارشناس آزمایشگاه)	یک نفر	دیپلم/ فوق دیپلم / لیسانس	گذراندن دوره آموزشی تئوری و عملی نمونه گیری از پاشنه پا	نمونه گیری از پاشنه پا

**ح) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت: (در صورت نیاز به دو یا چند فضای مجزا با ذکر مبانی محاسباتی مربوط به جزئیات زیر**

فضاها بر حسب متر مربع و یا برحسب بیمار و یا تخت ذکر گردد):

۱) نمونه گیری در مراکز نمونه گیری از پاشنه پا (خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی روستایی و شهری و بیمارستانها) ، که از

قبل آماده شده و در حال بهره برداری است، انجام می شود.

۲) نمونه گیری در بخش هایی که نوزاد بستری است.

**ط) تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت:**

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از سال ۱۳۸۴، تجهیزات پزشکی سرمایه ای را تهیه کرده و در آزمایشگاه غربالگری نوزادان

استان ها (۳۳ آزمایشگاه) قرار داده شده است. این آزمایشگاه ها تحت نظارت و پایش مستمر آزمایشگاه مرجع سلامت است.

**ی) داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:**

ردیف	اقدام مصرفی مورد نیاز	میزان مصرف (تعداد یا نسبت)
۱	لانتست ایمن	یک عدد برای هر نوزاد
۲	کاغذ گاتری	یک عدد برای هر نوزاد
۳	پد الکلی	یک عدد برای هر نوزاد
۴	چسب زخم دایره ای	یک عدد برای هر نوزاد
۵	پاکت برای ارسال نمونه به آزمایشگاه غربالگری نوزادان	یک عدد برای هر نوزاد
۶	کیت مخصوص انجام آزمایش TSH, PKU, G6PD برای غربالگری است.	هر کیت برای انجام ۹۰ آزمایش

**ک) استانداردهای ثبت (شامل گزارش نتایج درمانی و ثبت در پرونده بیمار و بررسی های حین درمان از جمله سوابق بیمار و تلفیق دارویی):**

ثبت اطلاعات شناسایی نوزاد، آدرس محل سکونت و دو شماره تلفن از والدین در فرم شماره ۱ برنامه، که یک نسخه از آن به همراه نمونه غربالگری به آزمایشگاه ارسال می شود.

**ل) اندیکاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت: (ذکر جزئیات مربوط به ضوابط پاراکلینیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز تعداد مواردی که ارائه**

این خدمت در یک بیمار، اندیکاسیون دارد):

بر اساس دستورالعمل های بین المللی و کشوری، همه نوزادان زنده متولد شده مکلف به دریافت این خدمت هستند.

**م) شواهد علمی در خصوص کنترا اندیکاسیون های دقیق خدمت:**

کنترا اندیکاسیونی ندارد.



(ن) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

ردیف	عنوان تخصص	میزان تحصیلات	مدت زمان مشارکت در فرایند ارائه خدمت	نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه خدمت
۱	نمونه گیر: <ul style="list-style-type: none"> <li>• بهورز</li> <li>• مراقب سلامت</li> <li>• ماما</li> <li>• کارشناس بهداشت</li> <li>• بهیار</li> <li>• پرستار</li> <li>• کاردان/کارشناس</li> <li>• آزمایشگاه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دیپلم</li> <li>• فوق دیپلم</li> <li>• لیسانس</li> </ul>	۲ ساعت	<ul style="list-style-type: none"> <li>• آماده سازی نوزاد</li> <li>• تکمیل فرم شماره ۱</li> <li>• اخذ نمونه از پاشنه پا</li> <li>• خشک کردن استاندارد نمونه</li> <li>• تحویل نمونه برای ارسال</li> <li>• تحویل جواب آزمایش</li> <li>• فراخوان نوزادان مشکوک</li> </ul>
۲	کارشناس آزمایشگاه	لیسانس	۳ ساعت	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دریافت نمونه از پست</li> <li>• وارد کردن اطلاعات در کامپیوتر</li> <li>• آزمایشگاه</li> <li>• پانچ نمونه و آماده سازی آن برای آزمایش</li> <li>• انجام آزمایش</li> <li>• آماده سازی جواب آزمایش ها</li> <li>• ارسال جواب آزمایشها به مراکز</li> <li>• نمونه گیری و بخش بیمارستانی</li> <li>• محل بستری نوزاد</li> </ul>

### س) مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:

- ارایه این خدمت نیازی به بستری کردن نوزاد ندارد و به صورت سرپایی در مراکز نمونه گیری از پاشنه پا انجام می شود.
- در نوزادان بستری هم در زمان بستری نوزاد در هر بخش بیمارستانی، بر اساس دستورالعمل نمونه گیری از نوزادان بستری برنامه کشوری، انجام می شود.

### ع) موارد ضروری جهت آموزش به بیمار (موارد آموزشی که باید به بیمار-همراه- به صورت شفاهی، کتبی در قالب فرم آموزش به بیمار، پمفلت

آموزشی، CD و ... آموزش داده شود تا روند درمان را تسریع نموده و از عوارض ناشی از درمان جلوگیری نماید):

- آموزش به مادران باردار در حین مراقبت های دوران بارداری، در ارتباط با غربالگری نوزادان و اهمیت انجام غربالگری در سن ۳-۵ روزگی تولد نوزاد و پیشگیری از عارضه عقب ماندگی ذهنی و دیگر عوارض جدی بیماری های مورد غربالگری (بیماری کم کاری تیروئید نوزادان، PKU و G6PD)
- ارایه برگه آموزشی غربالگری نوزادان و آدرس محل های نمونه گیری نزدیک به محل زندگی نوزاد در زایشگاه ها و بخش های زایمان به زانو
- توجیه مادر به انجام نمونه گیری از پاشنه پا در زمان مناسب
- بعد از نمونه گیری از پاشنه پا بر اساس استاندارد برنامه کشوری، آموزش های لازم برای پیگیری پاسخ و اهمیت آن به والدین داده می شود.

### منابع:

- 1) Ali Mohammadzadeh KH, Yarahmadi SH, Tabibi SJ, Ebraheh A. **Statistical evaluation and comparison of operational indices and analyzing cost-benefit of different regions of Iranian program of screening for congenital hypothyroidism.** Journal of Medicinal Plants Research. Vol 5(16), 2011: 3634-3642.

۲) کتاب دستورالعمل کشوری برنامه غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان

شماره کاغذ فیلتر:	<b>فرم شماره ۱ : نمونه گیری (برنامه کشوری غربالگری نوزادان)</b>		
مرکز بهداشت شهرستان:	دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی:		
پایگاه بهداشتی..... خانه بهداشت.....	شبکه بهداشت و درمان شهرستان:		
آدرس محل سکونت والدین:	شماره خانوار:	نمونه گیری: نوبت اول <input type="checkbox"/> نوبت دوم <input type="checkbox"/>	
	جنس: دختر <input type="checkbox"/> پسر <input type="checkbox"/>	تاریخ تولد نوزاد: .... / .... / ۱۳....	
	نام و نام خانوادگی: نوزاد	پدر	
	زمان نمونه گیری برحسب سن نوزاد به روز =	مادر	
	آیا نوزاد نیاز به نمونه گیری مجدد دارد؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر		
	نوع بیماری: CH <input type="checkbox"/> PKU <input type="checkbox"/> GPD <input type="checkbox"/> S.C <input type="checkbox"/> همه موارد <input type="checkbox"/>		
شماره تلفن تماس والدین: (۱)	علت نمونه گیری مجدد: نمونه نامناسب <input type="checkbox"/> ، TSH = ۵-۹/۹ <input type="checkbox"/> ، نوزاد نارس <input type="checkbox"/> ، نوزاد با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم، <input type="checkbox"/> نوزاد ماکروزوم <input type="checkbox"/> ، دو یا چندقلویی <input type="checkbox"/>		
نام و نام خانوادگی نمونه گیر: شماره تلفن محل نمونه گیری	بستری در بیمارستان و یا سابقه آن <input type="checkbox"/> ، تعویض و یادر یافت خون <input type="checkbox"/> ، سابقه مصرف داروهای خاص <input type="checkbox"/>		
شماره تلفن ستاد پیگیری بیماریهای شهرستان:	نسبت فامیلی والدین: غیر فامیل <input type="checkbox"/> فامیل درجه ۳ <input type="checkbox"/> فامیل درجه ۴ و بیشتر <input type="checkbox"/>		
تاریخ:      /      / ۱۳	نوع زایمان: طبیعی <input type="checkbox"/> سزارین <input type="checkbox"/>		
امضا:			