

واحد امور دارو

- ظروفی که محتوی سم است حتما با علامت مخصوص خطر . علامت گذاری کنید . دارو غذا نیست در صورت مصرف غیر صحیح می تواند سم باشد.
- با مصرف خودسرانه داروهای بدون تجویز پزشک سلامت خود را به خطر نیندازید.
- مقاومت به داروهای ضد میکروبی یک تهدید جهانی است. - استفاده نامحیح از آنتی بیوتیکها باعث مقاومت میکروبی و شیوع بیماریهای واگیر میشود.
- خطر مقاومت میکروبی اصلی ترین عارضه مصرف بی رویه و غیر منطقی آنتی بیوتیکها می باشد.
- چنانچه در خانه کودک زیر 5 سال دارید حتما داروها را در کمد های بالاتر و مجهز به قفل قرار دهید.
- در دسترس بودن و مصرف داروهای ترک اعتیاد مانند شربت متادون می تواند منجر به مرگ کودکان شود.
- اغلب مسمومیت ها در منزل رخ میدهد ، خانه خود را نسبت به بروز مسمومیت ها ایمن نمایید.
- استفاده خودسرانه از داروهای قاچاق و بدون مجوز بدنسازی در جوانان خطر ابتلا به انواع اختلالات جسمی و روانی را برای مصرف کننده در بر دارد.
- در هنگام مصرف دارو تاریخ انقضاء، انرا بررسی کنید.
- استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها ، یعنی مشارکت در گسترش مقاومت در باکتری ها "
- از تجویز اسپرین به کودکان مبتلا به آبله مرغان یا انفولانزا پرهیز نمایید ، این دارو ممکن است باعث سندروم reye شود.
- تجویز و مصرف منطقی داروها در دوران سالمندی به دلیل افزایش میزان و تعداد داروهای مصرفی و عوارض ناشی از آن ها ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است
- داروها را در درجه حرارت توصیه شده توسط سازنده نگهداری کنید.
- داروهای قلبی و اعصاب و روان باید به طور منظم و تحت نظر پزشک مصرف شوند، از کم و زیاد کردن مصرف این داروها بدون اطلاع پزشک جدا خودداری فرمایید.
- از مصرف خودسرانه دارو جدا پرهیز نمایید.
- بعضی از داروها خواب آور بوده لذا در هنگام رانندگی به توصیه هایی که بروی داروها ذکر شده توجه نمایید.
- بدون نظر و تجویز پزشک از خرد کردن دارو خودداری نمایید .
- در صورت بروز علائم جدید پس از مصرف دارو پزشک را مطلع سازید.
- در صورتی که به دارو یا داروهایی که حساسیت دارید پزشک را مطلع سازید.
- هنگام ابتلا به بیماری داروهای تجویز شده توسط پزشک را تا پایان دوره درمان مصرف نمایید.
- اگر دچار بیماری خاصی بوده یا دارو مصرف می نمایید پزشک را در هنگام مراجعه مطلع سازید.
- دارو ها را دور از دسترس اطفال نگه دارید.